



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ ЛИСИЦЫ И КОРСАКА
НЕВЫДЕЛАННЫЕ, ДОБЫТЫЕ ОХОТОЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 14174—89

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

**ШКУРКИ ЛИСИЦЫ И
КОРСАКА НЕВЫДЕЛАННЫЕ,
ДОБЫТЫЕ ОХОТОЙ**

Технические условия

**ГОСТ
14174—89**Undressed skins of fox and corsac-fox
obtained by hunting. Specifications

ОКП 98 7872, 98 7873, 98 7874

**Срок действия с 01.07.90
до 01.07.95**

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки лисицы красной, черно-бурой, лисицы-крестовки, лисицы-сидовушки и корсака.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки лисиц и корсака должны быть сняты трубкой, с разрезом, проходящим от фаланг пальцев задних конечностей к анальному отверстию по линии волосораздела черепа и огузка, с сохранением меха головы (посиком и ушами), лап (с коготками) и хвоста, очищены от остатков мышечной, жировой ткани, сухожилий и хрящей из ушей, костей из лап и хвоста; хорошо обезжирены без повреждения корней волос; оправлены волосом наружу на правилках (приложение 1) и законсервированы пресно-сухим способом; лапы хорошо расправлены.

1.2. Шкурки лисицы красной характеризуются волосным покровом на хребте и боках огненно-красного, бледно-алого, красно-серого, серого и светло-серого окраса. Черво красное, красно-серое, серебристое или темно-бурое.

1.3. Шкурки лисицы черно-бурой характеризуются волосным покровом черного окраса различной интенсивности. Допускаются буроватый или бурый оттенки.

1.4. Шкурки лисицы-крестовки характеризуются волосным покровом на хребте темно-серого окраса. На шее и плечах ярко выраженный темный крестообразный рисунок; черво и душа темно-серые; лапы темные или темно-серые, пух темно-голубой.

1.5. Шкурки лисицы-сиводушки характеризуются волосным покровом на хребте и боках темно-бурого, темно-серого, красно-бурого и светло-бурого окраса серебристого оттенка, пух темно-голубой. На шее и лопатках имеется темный крестообразный рисунок; черве, душка, лапы темно-серые или темно-бурые.

1.6. Шкурки корсака характеризуются волосным покровом на хребте и боках от серебристо-серого до красно-песочного, а на черве серебристо-серого окраса, пух светло-серый, светло-голубой или желто-песочный с различными оттенками.

1.7. Шкурки лисицы красной, крестовки, сиводушки и корсака в зависимости от состояния волосного покрова подразделяют на кряжи в соответствии с требованиями табл. 1.

Таблица 1

Наименование кряжа	Характеристика волосного покрова	Основные районы распространения
Лисица красная		
Камчатский	Пышный, плотный, шелковистый, слегка упругий, по окрасу огненно-красный, красный, красно-серый; черве преимущественно красное, иногда с темно-бурым пятном; душка серебристая, пышная	Камчатская, Магаданская области, Хабаровский край; Аляно-Майский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский и Охотский, Ноглинский, Александрово-Сахалинский и Тымовский районы
Якутский	Пышный, нежный, шелковистый; по окрасу преимущественно красный; черве красное, обычно с большим темно-бурым пятном; душка серебристо-серая	Якутская АССР
Сибирский	Пышный, шелковистый или менее шелковистый; по окрасу ярко-красный, красный, светло-красный или алый, черве красное, иногда с темным пятном, светло-красное, серебристо-серое или грязно-белое; душка белая, бело-голубая, светло-серая, серебристая	Амурская, Иркутская, Читинская, Томская области; Тюменская область, кроме районов, расположенных к югу от линии Тюмень—Тара; Приморский, Красноярский край; Хабаровский край и Сахалинская область, кроме районов, указанных в Камчатском кряже, Бурятская и Тувинская АССР
Западно-Сибирский	Менее пышный, грубоватый; по окрасу алый или светло-алый, черве и душка бело-голубые или грязновато-белые; встречаются шкурки юго-восточных районов пышные, шелковистые и гравастые, по окрасу	Алтайский край; Новосибирская, Омская, Кемеровская, Курганская, Тюменская (районы к югу от линии Тюмень—Тара) области; Казахская ССР; Кустанайская область—Федоровский, Джетыгаринский, Семозерский и Кустанайский

Наименование края	Характеристика воло- сяного покрова	Основные районы распространения
Северный	светло-алые или светло-песочные	районы; Тургайская область — Джангальдинский и Амангельдинский районы; Северо-Казахстанская область — Пресновский, Соколовский, Булаевский, Ленинский и Советский районы; Кокчетавская область — Кзылтусский, Эмбекшильдерский, Кокчатавский, Рузаевский, Арык-Балыкский и Шугинский районы
Центральный	Пышный, шелковистый или без шелковистости; по окрасу преимущественно красный, черево того же окраса, обычно с темным пятном, душка белая, лапы с широкой темной или черной полосой	Мурманская, Архангельская, Вологодская, Костромская, Горьковская (районы, расположенные к северу от р. Волги), Кировская, Пермская, Свердловская, Челябинская области, Карельская, Коми, Удмуртская АССР
Южный	Пышный или менее пышный, грубоватый; по окрасу преимущественно красный или светло-красный; черево красное, бледно-красное или белое, иногда с темным пятном; душка белая, лапы рыжие с темными полосами	Ленинградская, Калининская, Новгородская, Московская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Брянская, Псковская, Смоленская, Орловская, Калужская, Липецкая, Тамбовская, Пензенская, Тульская, Рязанская, Ульяновская, Куйбышевская, Оренбургская, Калининградская, Горьковская (районы, расположенные к югу от р. Волги) области, Эстонская, Латвийская, Литовская и Белорусская ССР, Марийская, Мордовская, Чувашская, Татарская, Башкирская АССР
Семипалатинский	Низкий, грубый или высокий, но редковатый; по окрасу красный, красно-серый, алый, светло-серый или серый, серо-желтый; черево белое, грязно-белое или красно-серое; душка белая или грязно-белая; лапы различного окраса с черными или серыми полосами	Курская, Белгородская, Саратовская, Воронежская, Волгоградская, Ростовская, Астраханская области, Ставропольский и Краснодарский края, Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Чечено-Ингушская, Калмыцкая, Северо-Осетинская АССР, Украинская, Молдавская, Грузинская, Азербайджанская, Армянская ССР
	Пышный, шелковистый и гривастый; по окрасу преимущественно светло-желтый или светло-алый	Восточно-Казахстанская, Семипалатинская, Карагандинская (Шетский район) области Казахской ССР

Продолжение табл. 1

Наименование края	Характеристика воло- сяного покрова	Основные районы распространения
Средне-Азиат- ский	Низкий, грубоватый или полугрубый, редкий, матовый или шелковистый; по окрасу красно-серый, серый, алый, светло-красный или бледно-желтый	Казахская ССР, кроме областей, указанных в Западно-Сибирском и Семипалатинском краях, Киргизская, Узбекская, Туркменская и Таджикская ССР
Лисица-крестовка и лисица-сиводушка		
Камчатский	Пышный, особенно на шейной части и у передних лап, шелковистый, ость длинная	Камчатская, Магаданская, Сахалинская области, Чукотский автономный округ, Хабаровский край (Охотский район), Якутская АССР
Северо-Сибир- ский	Пышный, менее шелковистый, ость длинная	Все районы, кроме указанных в Камчатском и Южном краях
Южный	Низкий, грубый с остью, как бы подпаленной на концах, более низкий на хребте, чем на череве	Ставропольский край (горные районы), Чечено-Ингушская, Дагестанская, Кабардино-Балкарская и Северо-Осетинская АССР, Армянская, Азербайджанская и Грузинская ССР
Корсак		
Казахский	Рослый, мягкий, серебристо-серого окраса; пух светло-серый или светло-голубой	Казахская ССР, Оренбургская, Куйбышевская, Челябинская, Омская, Новосибирская, Читинская области, Алтайский край, Башкирская АССР
Астраханский	Низкий, грубый, серо-песочного или красно-песочного окраса	Все районы, кроме указанных в Казахском крае

Примечания:

- Основным показателем края является характеристика волосяного покрова. Районы распространения являются дополнительным признаком.
- Шкурки караганки относят к Средне-Азиатскому краю.

1.8. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки лисицы черно-бурой подразделяют на цвета в соответствии с требованиями табл. 2.

1.9. В зависимости от степени серебристости волосяного покрова шкурки лисицы черно-бурой подразделяют на группы в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 2

Цвет	Характеристика окраски волосяного покрова
I	Волосяной покров черный или темный с хорошо выраженной чисто-белой серебристостью, а также чистого светло-серебристого окраса с выраженной вуалью, но с легким коричневым оттенком. Пушковые волосы темно-серые или серые.
II	Волосяной покров темно-бурый, светло-серебристый без вуали (открытая серебристость) или светло-серебристый с буроватым оттенком. Пушковые волосы темно-серые или светло-серые

Таблица 3

Группа	Серебристость волосяного покрова к длине шкурки, %
1	Св. 90,0
2	Св. 60,0 до 90,0 включ.
3	Св. 30,0 до 60,0 включ.

1.10. Шкурки лисиц и корсака в зависимости от состояния волосяного покрова подразделяют на сорта в соответствии с требованиями табл. 4.

Таблица 4

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожной ткани шкурки
Первый	Полноволосый, густой, с развитыми кроющими и пушковыми волосами. Кожевая ткань без синевы. Допускается легкая синева по всей площади шкурки.
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитыми кроющими и пушковыми волосами, особенно по хребту. Кожевая ткань синеватая.
Третий	Полуволосый, редковатый, со слабо развитыми, низкими кроющими и пушковыми волосами. Кожевая ткань синяя.

Примечание. Шкурки лисицы черно-бурой относят только к первому и второму сорту.

1.11. Шкурки лисицы черно-бурой подразделяют на размеры в соответствии с требованиями табл. 5.

Таблица 5

Размерная категория	Длина шкурки, см	Ширина шкурки, оправленной трубкой, см
1	От 85,0 и более	Не менее 12,5
2	От 60,0 до 84,9	Не менее 12,5

1.12. В зависимости от наличия пороков шкурки лиц и корпуса подразделяют на группы пороков в соответствии с требованиями табл. 6.

Таблица 6

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
1. Разрывы и швы общей длиной, см	До 10,0 включ.	Св. 10,0 До 25,0 включ.	Св. 25,0 до 50,0 включ.	Св. 50,0 однократной длины шкурки или неровные поперек
2. Дыры, вытертые места общей площадью, %	До 0,5 включ.	Св. 0,5 до 1,0 включ.	Св. 1,0 до 2,0 включ.	Св. 2,0 до 4,0 включ.
3. Сквозной волос общей площадью к площади шкурки, %	До 1,0 включ.	Св. 1,0 до 3,0 включ.	Св. 3,0 до 20,0 включ.	Св. 20,0 до 50,0 включ.
4. Присыпы общей площадью к площади шкурки, %	Не допускаются	Не допускаются	До 1,5 включ.	Св. 1,5 до 2,5 включ.
5. Признаки линьки	Не допускаются	Позднее шкурки со слегка поредевшей остью на боках или плечах	Раннее, поредевшие шкурки с поредевшей остью на боках или плечах, с грубой кожей	Раннее, поредевшие с сильно поредевшей остью на боках и плечах, с грубой кожей
6. Недостача частей шкурки	Не допускаются	Головы или хвоста	Головы с шей	Вырезанного черепа

Продолжение табл. 6

Наименование порока	Группа			
	первая	вторая	третья	четвертая
7. Исправления съема и первичная обработка	Не допускаются	Шкурки, снятые пластиком, плохо обезжиренные, плохо просушенные, мороженые, дежальные	Шкурки, лишены чернотой 1-й размерной категории с изрезанным кожным покровом на боках и шейной части вследствие перетянуто-	Комовая сушка

Примечания:

1. Допускается ушки разрывов.

2. Пороки на голове, лапах, шее, хвосте и черве оценивают не выше норм, установленных за недостатку ушей.

3. При различных пороках, расположенных на одном участке шкурки (порок на пороке), оценивают один наибольший порок.

4. Отсутствие белого лоска хвоста («типа») пороком не считают.

5. Характеристика пороков дана в приложении 2.

1.13. На шкурках допускается не более одного порока данной группы.

При совокупности различных пороков допускается:

на шкурках, относимых к группе «вторая», наличие не более двух различных пороков группы «первая»;

на шкурках, относимых к группе «третья», наличие не более двух различных пороков группы «вторая»;

на шкурках, относимых к группе «четвертая», наличие двух пороков группы «третья», или четырех пороков группы «вторая», или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая».

1.14. Оценку шкурок лисиц и корсака проводят в соответствии с приложением 3.

1.15. Маркировка и упаковка — по ГОСТ 12266.

1.16. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Бойтесь сырости».

2. ПРИЕМКА

2.1. Шкурки лисиц и корсака принимают партиями. Партией считают любое количество шкурок, оформленное одним документом о качестве.

2.2. Каждую шкурку партии подвергают оценке по всем показателям внешнего вида и размеру в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Длину шкурки измеряют от середины междуглазья до основания хвоста с погрешностью не более 0,5 см. Ширину шкурки измеряют посередине длины с погрешностью не более 0,5 см. Площадь шкурки определяют умножением ее длины на полную ширину.

3.2. Процент серебристости на шкурках лисицы черно-бурой определяют в зависимости от длины участка шкурки, на котором равномерно расположен серебристый волосяной покров:

за 100% принимают серебристость от ушей до основания хвоста;

за 90,0% — от середины шеи до основания хвоста;

за 60,0% — от нижнего края лопаток до основания хвоста;

за 30,0% — не менее $\frac{1}{3}$ длины шкурки.

3.3. Площадь пороков определяют путем вычисления площади прямоугольника, в который вписывается данный порок, с погрешностью не более 0,5 см².

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ


Шкурки лисиц и корсака транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое


ПРАВИЛКИ ДЛЯ ШКУРОК ЛИСИЦЫ ЧЕРНО-БУРОЙ (1),
ЛИСИЦЫ КРАСНОЙ, ЛИСИЦЫ-КРЕСТОВКИ, ЛИСИЦЫ-СИВОДУШКИ (2)
И КОРСАКА



Черт. 1



Черт. 2



Черт. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОКОВ ШКУРОК ЛИСИЦ И КОРСАКА

1. Вытертое место — участок шкурки частично лишенный волосяного покрова в результате механических повреждений.
2. Горелая шкурка — разрушение или потеря прочности кожной ткани плохо обезжиренной шкурки, сопровождающееся появлением коричневого оттенка в результате длительного хранения.
3. Дыра — сквозное отверстие в шкурке с потерей ее площади.
4. Лежалая шкурка — шкурка с пожелтевшей или покрасневшей кожной тканью и матовым волосяным покровом в результате длительного хранения в неблагоприятных условиях.
5. Мороженая шкурка — шкурка высушенная на морозе с рыхлой, утолщенной кожной тканью белого цвета.
6. Плесина — участок шкурки, лишенный волосяного покрова в результате заболевания животного или разложения кожной ткани.
7. Прелая шкурка — разложение кожной ткани шкурки в результате несвоевременного или неправильного хранения.
8. Разрыв — линейное сквозное повреждение шкурки без потери ее площади.
9. Сквозной волос — обнажение корней волос.
10. Шкурки, поврежденные молью, — повреждение волосяного покрова и кожной ткани личинками моли.
11. Шкурки, поврежденные кожеедом, — повреждение участков шкурки жуками и их личинками.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

Таблица 7

Оценка качества шкур лисицы красной, лисицы-крестовки,
лисицы-сиводушки и корсака в процентах

Виды лисицы	1-й сорт				2-й сорт			
	Группа пороков				Группа пороков			
	первая	вторая	третья	четвертая	первая	вторая	третья	четвертая
Лисица красная, корсак	100,0	90,0	75,0	50,0	75,0	67,5	56,3	37,5
Лисица-крестовка, лисица-сиводушка	100,0	90,0	75,0	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0

Продолжение табл. 7

Виды лисицы	3-й сорт			
	Группа пороков			
	первая	вторая	третья	четвертая
Лисица красная, корсак	50,0	45,0	37,5	25,0
Лисица-крестовка, лисица-сиводушка	50,0	45,0	37,5	25,0

Таблица 8

Оценка качества шкурок лисицы черно-бурой в процентах

Размерная категория шкурки	Цвет	Группа серебристости	Первый сорт				Второй сорт			
			Группа порока				Группа порока			
			черная	вторая	третья	четвертая	черная	вторая	третья	четвертая
1	I	1	120,0	107,8	90,0	60,0	96,0	86,4	72,0	48,0
		2	96,0	86,4	72,0	48,0	76,8	69,1	57,6	38,4
		3	60,0	54,0	44,9	30,0	48,0	43,2	36,0	24,0
	II	1	91,8	82,6	68,9	45,9	73,4	66,1	55,1	36,7
		2	73,4	66,1	55,1	36,7	58,7	52,9	44,0	29,4
		3	45,9	41,3	34,4	23,0	36,7	33,6	27,5	18,4
2	I	1	100,0	90,0	75,0	50,0	80,0	72,0	60,0	40,0
		2	80,0	72,0	60,0	40,0	64,0	57,6	48,0	32,0
		3	50,0	45,0	37,5	25,0	40,0	36,0	30,0	20,0
	II	1	76,5	68,9	57,3	38,3	61,2	55,1	45,9	30,6
		2	61,2	55,1	45,9	30,6	48,9	44,0	36,7	24,5
		3	38,3	34,4	28,7	19,1	30,6	27,5	23,0	15,3

Примечания:

1. Шкурки лисицы красной, черно-бурой, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака с пороками, превышающими нормы, установленные для четвертой группы пороков; весенние и позднелесенные с безжизненным, тусклым, поредшим волосным покровом, особенно на огулке, боках и плечах или с голым черевом; летние с низкой грубой остью почти без пуха и темно-синей кожной тканью; детенышей с пухлявым волосным покровом; прелые, гнилые, поврежденные молю и кожедом, а также шкурки лисицы черно-бурой, имеющие длину менее 60,0 см или ширину менее 12,5 см; с серебристостью волосного покрова менее 30% ее длины; полуволосяные с синей кожной тканью относятся к нестандартным.

Нестандартные шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака оценивают не более 25% от качества шкурок первого сорта. 1-й группы пороков соответствующего кряжа, а нестандартные шкурки лисицы черно-бурой — не более 25% от качества шкурок первого сорта, 1-й группы пороков, II цвета, 1-й группы серебристости, 2-й размерной категории.

2. Скидка от оценки по качеству, %:

за шкурки, снятые чулком, правленные кожной тканью наружу — 5;

за отсутствие каждой лапы — 2,5.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Центросоюзом СССР
РАЗРАБОТЧИКИ

В. Г. Сафонов, З. Х. Давлетов, Л. Д. Семакин

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением
Государственного комитета СССР по управлению качеством
продукции и стандартам от 07.12.89 № 36073. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ — 1994 г.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 14174—79

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-
ТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 12266—89	1.15
ГОСТ 14192—77	1.16

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Е. А. Богачкова*

Сдано в наб. 03.01.90 Подп. в печ. 08.02.90 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,83 уч.-изд. л.
Тир. 5000 Цена 5 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123587, Москва, ГСП, Новопроспектский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1475