

СЫРЬЕ ЭФИРОМАСЛИЧНОЕ ЦВЕТочно- ТРАВЯНИСТОЕ

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ

Издание официальное

БЗ 9—2004



Москва
Стандартинформ
2004

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**СЫРЬЕ ЭФИРОМАСЛИЧНОЕ
ЦВЕТОЧНО-ТРАВЯНИСТОЕ****Методы определения примесей****ГОСТ
28607—90**Essential oil floral-herbal
raw material. Methods of impurities determinationМКС 67.220.10
ОКСТУ 9726Дата введения **10.02.91**

Настоящий стандарт распространяется на эфиромасличное цветочное и травянистое сырье, предназначенное для промышленной переработки, и устанавливает методы определения примесей.

1. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

1.1. Отбор проб и выделение навесок — по ГОСТ 28605.

2. АППАРАТУРА

Весы лабораторные общего назначения с погрешностью взвешивания не более 0,1 и 5 г.

Секатор по ГОСТ 4153 или ножницы по ГОСТ 21239.

Полотна решетчатые по НТД.

Линейка по ГОСТ 427.

Пинцет.

Шпатель.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ**3.1. Определение сорной примеси и примеси других эфиромасличных растений в составе эфиромасличного сырья**

3.1.1. Из навески сырья вручную выделяют отдельно сорную примесь и примесь других эфиромасличных растений, взвешивают их.

3.2. Определение примеси данного растения

3.2.1. Из навески сырья вручную выделяют примеси данного растения отдельно по фракциям и взвешивают их.

3.2.2. Определение примеси данного растения в сырье лаванды

После выделения из навески сырья сорной примеси и примеси других эфиромасличных растений из оставшейся части сырья выделяют навеску массой $(100,0 \pm 1)$ г.

Соцветия укладывают пучком с расположением нижних (неложных) подмутовок на одном уровне. Затем на расстоянии 10 см от нижних подмутовок стебли отрезают ножницами или секатором. Из сырья выбирают листья, части стеблей и присоединяют их к отрезанным стеблям. В результате получают примесь «листья и стебли».

Из сырья, освобожденного от примеси листьев и стеблей, выбирают:

перезревшие и незрелые соцветия лаванды;

почерневшие, прелые, заплесневевшие соцветия.

Выделенные фракции примесей отдельно взвешивают.

3.2.3. Определение примеси данного растения в сырье шалфея мускатного

После выделения из навески сырья сорной примеси и примеси других эфиромасличных растений от каждого соцветия шалфея мускатного отрезают части стебля с листьями, включая верхнюю пару черешковых листьев, добавляют черешковые листья и части стебля, попавшие в навеску, и получают примесь «листья и стебли».

Из навески, освобожденной от указанных выше примесей, выделяют:

перезревшие и недозревшие соцветия шалфея;

заплесневевшие, прелые, почерневшие соцветия шалфея.

Выделенные фракции примесей отдельно взвешивают.

3.3. Определение массовой доли листьев и соцветий в целых растениях мяты

3.3.1. После выделения из навески сырья сорной примеси и примеси других эфиромасличных растений от растений мяты отделяют листья и соцветия и взвешивают их.

3.4. Характеристика и состав примесей изложены в стандарте на данную культуру.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю каждой фракции примеси (X_n) в процентах вычисляют по формуле

$$X_n = \frac{m_n}{m} \cdot 100,$$

где m_n — масса примеси в навеске сырья, г;

m — масса навески сырья, г.

4.2. Массовую долю листьев и соцветий в сырье целых растений мяты (X_d) в процентах вычисляют по формуле

$$X_d = \frac{m_d}{m} \cdot 100,$$

где m_d — масса листьев и соцветий в навеске сырья, г;

m — масса навески сырья, г.

4.3. Все вычисления проводят до второго десятичного знака с последующим округлением результата до первого десятичного знака.

4.4. Округление полученных результатов проводят следующим образом: если первая из цифр равна или больше пяти, то последнюю сохраняемую цифру увеличивают на единицу, если меньше пяти, то ее оставляют без изменения.

4.5. При разногласиях между потребителем и поставщиком проводят повторный анализ.

Расхождения между результатами первоначального и повторного анализов не должны превышать норм, указанных в приложении.

При превышении допустимого расхождения за окончательный результат принимают результат повторного анализа.

ДОПУСКАЕМЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ МЕЖДУ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО И ПОВТОРНОГО АНАЛИЗОВ

Массовая доля примеси, %	Допускаемое расхождение, %, не более	Массовая доля примеси, %	Допускаемое расхождение, %, не более
До 0,5 включ.	$\pm 0,2$	6,1—7,0	$\pm 1,6$
0,6—1,0	$\pm 0,4$	7,1—8,0	$\pm 1,8$
1,1—2,0	$\pm 0,6$	8,1—9,0	$\pm 2,0$
2,1—3,0	$\pm 0,8$	9,1—10,0	$\pm 2,2$
3,1—4,0	$\pm 1,0$	10,1—15,1	$\pm 3,0$
4,1—5,0	$\pm 1,2$	15,1—25,0	$\pm 3,8$
5,1—6,0	$\pm 1,4$		

Пример 1. Массовая доля примеси (листа и стебля) по результатам первоначального анализа — 7,5 %, по результатам повторного анализа — 8,8 %.

Расхождение — 1,3 %.

При массовой доле примеси 8,8 % допускаемое расхождение — 2,0 %. Следовательно первоначальный анализ проведен правильно.

Пример 2. Массовая доля примеси (сорной) по результатам первоначального анализа — 2,6 %, по результатам повторного анализа — 3,8 %.

Расхождение — 1,2 %.

При массовой доле примеси 3,8 % допускаемое расхождение — 1,0 %. Расхождение между результатами первоначального и повторного анализов превышает допускаемое расхождение. В этом случае первоначальный анализ считают неправильным и за окончательный результат принимают результат повторного анализа.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Минмедпромом СССР
 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.07.90 № 2098
 3. ВЗАМЕН ОСТ 18—464—85
 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
- | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела, пункта |
|---|-----------------------|
| ГОСТ 427—75 | 2 |
| ГОСТ 4153—93 | 2 |
| ГОСТ 21239—93 | 2 |
| ГОСТ 28605—90 | 1.1 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)
 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2005 г.

Редактор *Л.И. Нахимова*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *В.Е. Нестерова*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 01.06.2005. Подписано в печать 23.06.2005. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч. изд. л. 0,30. Тираж 57 экз. Зак. 398. С 1438.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лядин пер., 6.