

ХЛОПОК-СЫРЕЦ СЕМЕННОЙ И СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА

МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2010

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ХЛОПОК-СЫРЕЦ СЕМЕННОЙ
И СЕМЕНА ХЛОПЧАТНИКА

Методы отбора проб

Seed raw cotton and cotton seed.
Methods of samplingМКС 59.060.10
65.020.20
ОКСТУ 9709ГОСТ
21820.0—76

Дата введения 01.07.77

1. Настоящий стандарт распространяется на семенной хлопок-сырец и предназначенные для посева семена хлопчатника и устанавливает методы отбора проб для определения посевных качеств семян.

2. В зависимости от массы партии семенного хлопка-сырца или семян хлопчатника отбор проб производят от партии или ее части. Масса контрольной единицы, установленная для семенного хлопка-сырца и семян хлопчатника, приведена в табл. 1.

Таблица 1

т, не более

Репродукция семян	Масса контрольной единицы		
	семенного хлопка-сырца при комплектовании партии	семян при очистке и хранении	
		непротравленных	протравленных
Элита	15	5	10
Первая репродукция	30	10	20
Вторая репродукция	60	20	40
Третья и последующие репродукции	150	50	100

П р и м е ч а н и я:

1. При определении качества семян в период хранения семенного хлопка-сырца за контрольную единицу принимают бунт, амбар или отсек складского помещения.

2. При определении качества при перевозке семян за контрольную единицу принимают вагон, баржу, рейс автоколонны.

3. Термины «контрольная единица», «навеска», «точечная проба», «объединенная проба», «средняя проба» — по ГОСТ 20290.

Определение партии приведено в приложении 1.

Наименование и форма документов, удостоверяющих качество семян, приведены в приложениях 2—4.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Отбор проб проводят от всей партии, если ее масса равна или менее массы контрольной единицы, указанной в табл. 1. В случае превышения установленной массы контрольной единицы партию на глаз делят на части, соответствующие массе контрольной единицы, и проводят отбор проб отдельно от каждой части.

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1976
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

При разбивке партии составляют схему и нумеруют выделенные части (контрольные единицы).

Пример. Масса партии непротравленных семян хлопчатника второй репродукции 57 т. Перед отбором проб, исходя из табл. 1 и массы партии, ее на глаз делят по вертикали на три равные части (контрольные единицы), как указано на черт. 1.

Схема деления партии семян на контрольные единицы



а — семена в мешках; б — насыпь семян

Черт. 1

5. Методы отбора точечных проб от семенного хлопка-сырца

5.1. При комплектовании или перевозке партии семенного хлопка-сырца точечные пробы отбирают ежедневно от семенного хлопка-сырца, заготовленного или перевезенного за день.

Точечные пробы берут равномерно по всей горизонтальной поверхности бунта, комплектуемого на хлопкозаготовительном пункте и хлопкоочистительном заводе, по две точечные пробы на 10 м²: одну на глубине 10 см, другую — 50 см. Отбирают точечные пробы рукой.

5.2. Для отбора точечных проб от партии семенного хлопка-сырца, хранящегося в бунтах, на поверхности бунта намечают линии — по три на продольных сторонах и по одной на торцевых сторонах. Разовые пробы отбирают вдоль намеченных линий на расстоянии не менее 50 см друг от друга (см. черт. 2) на глубине не менее 10 см от поверхности бунта.

5.3. Для отбора точечных проб от семенного хлопка-сырца, хранящегося в складских помещениях, выкапывают колодцы — по одному на каждый отсек амбара или склада.

Точечные пробы отбирают через каждые 50 см внутренней вертикальной поверхности колодца.

5.4. От хлопка-сырца, упакованного в мешки, точечные пробы отбирают: от каждого мешка — при наличии в партии до 20 мешков; от каждого 10-го мешка (но не менее чем от 15) — при наличии в партии 21—150 мешков; от каждого 20-го мешка (но не менее чем от 20) — при наличии в партии более 150 мешков. Разовые пробы отбирают рукой из середины мешка.

5.5. Массу точечных проб семенного хлопка-сырца рассчитывают таким образом, чтобы масса составленной из них объединенной пробы была не менее 8 кг.

6. Методы отбора точечных проб от семян хлопчатника

6.1. От семян, хранящихся насыпью, точечные пробы отбирают равномерно со стенок колодцев, которые выкапывают на всю глубину насыпи — по одному колодцу на контрольную единицу.

Перед повторным отбором точечных проб сохранившиеся колодцы расчищают и точечные пробы берут на расстоянии не менее 20 см от поверхности стенок.

От партии естественно оголенных семян, обладающих повышенной сыпучестью, пробы берут шупом, при этом колодцы не выкапывают.

Схема расположения мест отбора разовых проб



Примечание. Знак «X» — означает место отбора разовой пробы.

Черт. 2

6.2. От семян, упакованных в мешки, точечные пробы отбирают: от каждого мешка — при наличии в партии до 10 мешков; от каждого пятого мешка (но не менее чем от 10) — при наличии в партии 11—100 мешков; от каждого десятого мешка (но не менее чем от 20) — при наличии в партии более 100 мешков.

Точечные пробы отбирают щупом или рукой из середины мешка.

6.3. Во время очистки партии семенного хлопка-сырца, оголения, сортирования, калибрования или централизованного обеззараживания семян точечные пробы берут механическим пробоотборником, установленным на выходе посевной фракции семян.

При отсутствии пробоотборника точечные пробы берут ковшом, кружкой или горстью, пересекая струю семян по всей ее ширине через равные промежутки времени, но не реже чем через 30 мин.

6.4. Массу точечных проб семян рассчитывают таким образом, чтобы масса составленной из них объединенной пробы была не менее 5 кг.

7. Составление объединенной пробы

7.1. Отобранные точечные пробы рассматривают с целью выявления их однородности по цвету, запаху, засоренности и другим признакам.

Однородные точечные пробы объединяют в объединенную пробу отдельно по каждой контрольной единице (партии) семенного хлопка-сырца или семян.

Точечные пробы, в которых обнаружена неоднородность, не объединяют, а соответствующие им части партии выделяют для отдельного анализа посевных качеств семян. В этом случае отбор точечных проб и составление объединенной пробы производят заново.

При невозможности выделить часть партии проводят доработку (очистку, сушку) всей партии, а затем повторный отбор проб.

Разд. 5—7. (Измененная редакция, Изм. № 1).

8. Выделение средних проб семенного хлопка-сырца

8.1. Для выделения средних проб объединенную пробу семенного хлопка-сырца высыпают на стол, лист фанеры, картона или плотной бумаги, тщательно перемешивают не менее шести раз, сгребая одновременно с двух сторон к центру, затем разравнивают толщиной слоя 4—6 см, придают ему форму квадрата, который делят на 16 частей. Отбирая хлопок-сырец из разных мест каждой части, набирают последовательно средние пробы.

8.2. Из объединенной пробы семенного хлопка-сырца, отобранного при комплектовании партии, выделяют средние пробы массой по 1 кг каждый: один для определения всхожести и зрелости семян и второй для определения механической поврежденности семян.

Если партия семенного хлопка-сырца, предназначенная для оголения, состоит из одной контрольной единицы, для определения всхожести и зрелости семян отбирают среднюю пробу массой 2 кг.

Средние пробы, предназначенные для определения всхожести и зрелости семян, должны поступать в семенную лабораторию в виде семян, пролущенных на десятипильном лабораторном джине. Остаточная волокнистость семян допускается не более норм, установленных стандартом на посевные качества семян.

Для определения однородности семян по размерам среднюю пробу выделяют из остатков средних проб семян после определения всхожести и зрелости. Остатки средних проб объединяют и методом квартования выделяют 1 кг семян.

8.1, 8.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

8.3. Для определения механической поврежденности семян в семенном хлопке-сырце ручного сбора средние пробы, отобранные от контрольных единиц одной партии, смешивают и методом, указанным в п. 8.1, выделяют 1 кг хлопка-сырца.

Для определения механической поврежденности семян в семенном хлопке-сырце машинного сбора анализируют средние пробы, отобранные от каждой контрольной единицы.

8.4. Из объединенной пробы, отобранной в период хранения семенного хлопка-сырца, выделяют одну среднюю пробу массой 1 кг для определения всхожести, влажности и горелости семян. Проба должна поступить в семенную лабораторию в виде семян.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

9. Выделение средних проб семян хлопчатника


9.1. Средние пробы семян выделяют из объединенных проб методом квартования. Для этого семена общей пробы высыпают на лист фанеры, картона, плотной бумаги или гладкий стол с нанесенными двумя диагоналями и квадратами (черт. 3 и 4) и тщательно перемешивают не менее шести раз двумя деревянными планками или линейками, сгребая семена одновременно с двух

противоположных краев к центру, стараясь держать линейки параллельно то одной, то другой диагонали. При таком перемешивании достигается равномерное распределение мелких частиц примеси в массе семян. Затем семена разравнивают в виде квадрата слоем толщиной до 3 см и по диагоналям делят на четыре части. Семена двух противоположных треугольников удаляют, а двух оставшихся — соединяют вместе, перемешивают и вновь делят. Эту операцию повторяют до тех пор, пока в каждом треугольнике не останется примерно по 500 г семян. Из семян, образующих два противоположных треугольника, составляют среднюю пробу массой 1 кг для общих анализов: определения всхожести, массы 1000 семян, абсолютной массы, горелости, засоренности, механической поврежденности, остаточной волокнистости, остаточной опушенности оголенных семян. Семена из двух других треугольников перемешивают, делят, как описано выше, чтобы составить средний образец массой 500 г для определения влажности и зараженности семян амбарными вредителями.

Также применяя метод квартования, из объединенной пробы, взятой от посевной фракции, полученной при калибровании, выделяют среднюю пробу массой 1 кг для определения выравниваемости семян, а от объединенной пробы, отобранной от дражированных семян, выделяют среднюю пробу массой 3 кг для определения точности посева семян.


Перечень лабораторных анализов посевных качеств семян хлопчатника приведен в приложении 5.

Разметка листа для выделения средних проб и навесок семян



Черт. 3

Схема деления семян по диагонали



Черт. 4

10. Допускается выделять из объединенной пробы несколько параллельных средних проб.

9.1, 10. (Измененная редакция, Изм. № 1).

11. Пробу семян, предназначенную для проведения общих анализов (кроме определения влажности и зараженности), помещают вместе с регистрационным бланком (см. приложение 6) в мешок из плотной ткани, а среднюю пробу семян, предназначенную для определения влажности и зараженности семян амбарными вредителями вместе с отрывным талоном регистрационного бланка помещают в чистую, сухую стеклянную посуду соответствующей вместимости, которую плотно закупоривают притертой пробкой.

Если проба, предназначенная для определения влажности и зараженности амбарными вредителями, может быть подвергнута анализу в течение 6 ч после отбора, то допускается помещать семена в железную банку с плотно закрывающейся крышкой.

12. Средние пробы семенного хлопка-сырца должны быть доставлены в семенную лабораторию в течение трех дней после отбора, семян хлопчатника — в день отбора.

13. Анализ проб, поступивших в семенную лабораторию, должен быть начат в день поступления пробы и окончен не позднее следующего дня, за исключением анализа по определению всхожести, который заканчивают через пять дней для опушенных и через четыре — для оголенных семян.

14. При поступлении в семенную лабораторию средних проб проверяют целостность упаковки, массу пробы, правильность заполнения регистрационного бланка, соответствие количества средних проб массе партии. Средние пробы, не отвечающие перечисленным требованиям, для анализа не принимают. Поступившие пробы регистрируют в регистрационном журнале. Форма записи приведена в приложении 7. Средние пробы, выделенные из одной общей пробы, записывают под одним номером.

15. Выделение навесок для проведения анализа семян

15.1 Среднюю пробу семян методом квартования уменьшают до 250—300 г, перемешивают и

делают на четыре треугольника. От каждого из двух противоположных треугольников семян отвешивают по 50 г семян для определения засоренности и механической поврежденности. Семена двух треугольников массой 125—150 г собирают в виде валика, из которого отсчитывают восемь проб по 100 шт. семян в каждой. Отсчет ведут с правой стороны валика, отделяя каждый раз подряд без выбора по 5 шт. семян, и раскладывают их на картон, расчерченный на 20 квадратов. Берут семена, которые сохранили не менее $\frac{2}{3}$ своего естественного размера.

Две пробы по 100 шт. семян в каждой используют для анализа всхожести, другие две пробы по 100 шт. семян — для определения массы 1000 шт. семян и абсолютной массы, две пробы по 100 шт. — для определения зрелости, две пробы по 100 шт. для определения горелости.

Из оставшихся в валике семян также подряд, без выбора отвешивают две навески массой по 10 г для определения остаточной волокнистости по опушенным семенам или две навески массой по 30 г — для анализа остаточной опушенности оголенных семян. При этом свободное волокно, пух и сор в навеску не включаются.

15.2. Из остатков средней пробы дражированных семян методом квартования выделяют две навески массой по 100 г каждая — для определения осыпаемости драже и две навески массой по 50 г каждая — для определения полноты протравливания.

Из остатков средней пробы протравленных опушенных семян методом квартования выделяют две навески массой по 25 г для определения полноты протравливания.

15.3. Среднюю пробу, предназначенную для определения влажности и зараженности амбарными вредителями, высыпают из банки, тщательно перемешивают, разравнивают слоем толщиной в одно семя, после чего, отбирая по два-три семени из разных мест слоя, набирают две навески массой по 10 г, которые помещают в заранее взвешенные металлические стаканчики. Около 80 г семян, отобранных, как описано выше, помещают в банку с притертой пробкой, где их хранят до окончания анализа на случай, если потребуется повторный анализ. Остаток средней пробы после отбора семян для определения влажности — 400 г целиком используют для определения зараженности амбарными вредителями.

15.4. Среднюю пробу, предназначенную для определения выравненности семян по размерам, высыпают на гладкую поверхность, тщательно перемешивают, разравнивают толщиной слоя 1 см, делают на четыре треугольника, из которых два противоположных объединяют. Из каждой части пробы методом, указанным в п. 15.3, составляют навеску массой 250 г.

Для определения однородности семян по размерам среднюю пробу семян оголяют серной кислотой и выделяют две навески массой по 250 г каждая.

15.5. Среднюю пробу хлопка-сырца массой 1 кг, предназначенную для определения механической поврежденности семян, высыпают на стол, тщательно перемешивают, разравнивают в виде квадрата, делают на 16 равных частей и из разных мест каждой части набирают две навески массой по 100 г в долбках из сырца ручного сбора или в лотках из сырца машинного сбора.

15.6. Остатки средних проб, использованных для определения качества семян, за исключением проб, использованных для определения влажности и зараженности амбарными вредителями, после проведения всех анализов хранятся лабораторией в мешках с соответствующими регистрационными бланками до начала нового заготовительного сезона. По истечении этого срока пробы обезличивают. Семена хранят в лаборатории в специальном сухом помещении.

16. Отбор проб для определения посевных качеств семян хлопчатника производят отделы технического контроля хлопкоочистительных заводов при комплектовании, хранении, поступлении с заготовщиков семенного хлопка-сырца; при очистке, сортировании, оголении, калибровании, обеззараживании, хранении, поступлении от других хлопкоочистительных заводов партий семян.

От партий семенного хлопка-сырца и семян посевных сборов, а также партий, предназначенных для опытной работы и государственного сортоиспытания, отбор проб проводят организации, для которых предназначены семена.

17. Определение посевных качеств семян проводят семенные хлопковые лаборатории.

В процессе технологии обработки семян хлопчатника контроль посевных качеств семян по показателям механической поврежденности, остаточной волокнистости, остаточной опушенности производят отделы технического контроля хлопкозаводов.

18. Контроль за правильностью отбора проб семенного хлопка-сырца и семян проводят семенные хлопковые лаборатории.

При разногласиях по качеству семян отбор проб проводит Центральная или республиканская контрольно-семенная хлопковая станция.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ СЕМЕННОГО ХЛОПКА-СЫРЦА И СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА

Партией семенного хлопка-сырца считают количество семенного хлопка-сырца, собранного в одном хозяйстве с одной группы полей, одного ботанического сорта, одинаковой репродукции, сортовой чистоты, одного года урожая, происходящего из одного элитного хозяйства, одного промышленного сорта скомплектованного не более чем за 15—20 дней в сентябре и за 10—15 дней в октябре, оформленное одним документом о качестве.

Партией семян считают любое количество семян хлопчатника, полученных в один срок из одной партии семенного хлопка-сырца, однородных по посевным качествам, оформленных одним документом о качестве.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

Семенная лаборатория
при _____ хлопкозаводе
* * _____ 19 ____ г.
№ _____

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОСЕВНЫХ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА

Партия семян № _____ опушенных, оголенных, калиброванных, протравленных, дражированных (нужное подчеркнуть), массой _____ полученная от очистки хлопка-сырца партии № _____, заготовленного в районе _____ заготпункте _____, сорт хлопчатника _____ репродукция _____ сортовая чистота _____, группа полей по апробации _____

1. Энергия прорастания _____ %
2. Всхожесть _____ %
3. Влажность _____ %
4. Засоренность _____ %
5. Семян карантинных сорняков _____
6. Механическая поврежденность _____ %
7. Зрелость _____ %
8. Остаточная волокнистость _____ %
9. Остаточная опушенность _____ %
10. Горелость _____ %
11. Амбарных вредителей _____ шт. на 1 кг
12. Масса 1000 семян _____ г.
13. Полнота протравливания _____ %
14. Осыпаемость драже _____ %
15. Выравненность по размерам _____ %
16. Номер высевашающего диска _____ %
17. По данной партии проанализировано _____ средних проб
18. Заключение семенной лаборатории _____

19. Настоящая форма выдана _____
(хлопкозаводу, колхозу, совхозу и др.)

М. П. _____ Зав. семенной лабораторией _____
(Подпись)

(Фамилия, и., о.)

Семенная хлопковая лаборатория при хлопкозаводе

КОРЕШОК СЕРТИФИКАТА № _____ на
хлопковые посевные семена (действителен в течение
2 месяцев со дня выдачи)

* * _____ 19 ____ г.

Выдан (кому) _____

На семенную партию № _____ массой _____ т.,
полученной от очистки семенного хлопка-сырца
партии № _____, заготовленного в _____(указать район, заготпункт, колхоз, совхоз)
в 19 ____ г., предназначенную к отправке _____

(указать, кому отправлены)

Семена одинарного, двойного линтерования, ого-
ленные, калиброванные, протравленные, дражи-
рованные _____

(нужное подчеркнуть)

Способ оголения семян _____

Сорт хлопчатника _____

Репродукция _____

Сортовая чистота _____ %

Группа полей по апробации _____

Происхождение семян _____

(указать элитное хозяйство)

Результат анализа семян

Энергия прорастания _____ %, всхожесть

_____ %, зрелость _____ %, влажность

_____ %, механическая поврежденность

_____ %, засоренность _____ %, остаточная

волокнистость _____ %, масса 1000 семян

_____ г, горелость _____ %, полнота

протравливания _____ %, остаточная

опушенность _____ %, выравненность

_____ %, осыпаемость драже _____ %,

номер высевашего диска _____ длина волокна

_____ мм, выход волокна _____ %

По партии проанализировано _____

средних проб

Примечание _____

М. П. Зав. семенной хлопковой лабораторией

(подпись)

(Фамилия, и., о.)

Семенная хлопковая лаборатория при хлопкозаводе

СЕРТИФИКАТ № _____

на хлопковые посевные семена (действителен в
течение 2 месяцев со дня выдачи)

* * _____ 19 ____ г.

Выдан (кому) _____

На семенную партию № _____ массой _____ т.,

полученную от очистки семенного хлопка-сырца

партии № _____, заготовленного в _____

(указать район, заготпункт, совхоз, колхоз)
в 19 ____ г., предназначенную к отправке _____

(указать, кому отправлены)

Семена одинарного, двойного линтерования, ого-
ленные, калиброванные, протравленные, дражи-
рованные _____

(нужное подчеркнуть)

Способ оголения семян _____

Сорт хлопчатника _____

Репродукция _____

Сортовая чистота _____ %

Группа полей по апробации _____

Происхождение семян _____

(указать элитное хозяйство)

Результат анализа семян

Энергия прорастания _____ %, всхожесть

_____ %, зрелость _____ %, влажность

_____ %, механическая поврежденность

_____ %, засоренность _____ %, остаточная

волокнистость _____ %, масса 1000 семян

_____ г, горелость _____ %, полнота

протравливания _____ %, остаточная

опушенность _____ %, выравненность

_____ %, осыпаемость драже _____ %,

номер высевашего диска _____ длина волокна

_____ мм, выход волокна _____ %

По партии проанализировано _____

средних проб

Примечание _____

М. П. Зав. семенной хлопковой лабораторией

(подпись)

(Фамилия, и., о.)

Оборотная сторона сертификата
Кому отгружены посевные семена
партии №

Наименование получателя семян (република, хлопковод, колхоз, пункт и др.)	Дата отправки семян	Номер дубликатов сертификатов	Номер вагонов, автомашин	Количество мешков	Масса отправляемых семян, т	
					брутто	нетто

Оборотная сторона
корешка сертификата
Кому отгружены посевные семена
партии №

[illegible]

ДУБЛИКАТ СЕРТИФИКАТА №

Хлопкозавод № _____ от « » _____ 19__ г.
(указать местонахождение завода)

Выдан на основании сертификата № _____ от « » _____ 19__

Выдан _____
(название организации)

на посевные семена хлопчатника партии № _____ массой _____, полученные от очистки хлопка-сырца партии № _____, заготовленного в районе _____ в 19__ г., отправленные _____

_____ (название хлопкозавода, хлопкозаготпункта и др.)
по накладной № _____ литерованные, оголенные, калиброванные, сортированные, протравленные, дражированные _____
(нужное подчеркнуть)

Результаты анализов

1. Сорт хлопчатника _____
2. Происхождение семян (элитное хозяйство, выпустившее элиту) _____
3. Репродукция _____ %
4. Сортная чистота _____ %
5. Группа полей по апробации _____ %
6. Всхожесть _____ %
7. Зрелость _____ %
8. Влажность _____ %
9. Механическая поврежденность _____ %
10. Засоренность _____ %
11. Остаточная волокнистость _____ %
12. Масса 1000 семян _____ %
13. Горелость _____ %
14. Полнота протравливания _____ %
15. Остаточная опушенность _____ %
16. Выравненность по размерам _____ %
17. Осыпаемость драже _____ %
18. Номер высевашей диска _____
19. По данной партии проанализировано _____ проб

Примечание: _____

Начальник отдела заготовок хлопкозавода _____
(подпись)

(Фамилия, и., о.)

Ст. агроном хлопкозавода _____ (Фамилия, и., о.)
Зав. семенной лабораторией _____ (подпись) _____ (Фамилия, и., о.)

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Дата отправки	Порядковый номер	Номер вагона, автомашин	Количество мешков	Масса семян, кг	
				брутто	нетто

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА

Стадия подготовки семян	Определяемый показатель качества
1. Комплектование партии семенного хлопка-сырца в том числе для партий, предназначенных к оголению	Всхожесть, влажность, механическая поврежденность, зрелость
2. Непрерывный технологический процесс подготовки опушенных семян:	Всхожесть, влажность, механическая поврежденность, зрелость, однородность по размерам
а) после линтерования, сортирования, до обеззараживания:	
при сухом способе обеззараживания	Влажность, остаточная волокнистость, механическая поврежденность, засоренность, масса 1000 семян
при полувлажном способе обеззараживания	То же, кроме влажности
б) после линтерования, сортирования и обеззараживания:	
при сухом способе обеззараживания	Всхожесть, полнота протравливания
при полувлажном способе обеззараживания	Всхожесть, влажность, полнота протравливания
3. Прерывный технологический процесс подготовки опушенных семян:	
а) после линтерования, сортирования, до обеззараживания	Всхожесть, влажность, остаточная волокнистость, механическая поврежденность, засоренность, масса 1000 семян
б) после линтерования, сортирования и обеззараживания:	
при сухом способе обеззараживания	Всхожесть, полнота протравливания
при полувлажном способе обеззараживания	Всхожесть, влажность, полнота протравливания
4. Непрерывный технологический процесс подготовки оголенных семян:	
а) после механического оголения, калибрования до протравливания	Механическая поврежденность, засоренность, остаточная опушенность, масса 1000 семян, выравненность, точность высева
б) после механического оголения, калибрования и протравливания	Всхожесть, влажность, точность высева, полнота протравливания, осыпаемость драже
5. Прерывный технологический процесс подготовки оголенных семян:	
а) после линтерования до оголения	Всхожесть, влажность, механическая поврежденность
б) после механического оголения, калибрования, до протравливания	Механическая поврежденность, засоренность, остаточная опушенность, масса 1000 семян, выравненность
в) после механического оголения, калибрования и протравливания	Всхожесть, влажность, точность высева, полнота протравливания, осыпаемость драже
6. Хранение семян всех способов подготовки	Всхожесть, влажность, горелость, зараженность амбарными вредителями
7. Поступление семян от других хлопкозаводов:	
а) опушенных, непротравленных	Всхожесть, влажность, остаточная волокнистость, механическая поврежденность, засоренность
б) опушенных, протравленных	Всхожесть, влажность, механическая поврежденность, полнота протравливания
в) механически оголенных, непротравленных	Всхожесть, влажность, механическая поврежденность, засоренность, остаточная опушенность
г) механически оголенных, протравленных	Всхожесть, влажность, механическая поврежденность, полнота протравливания
8. Хранение партий семенного хлопка-сырца в неблагоприятных условиях	Всхожесть, влажность, горелость

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК
к средней пробе посевных семян хлопчатника (семенного
хлопка-сырца), взятых при

комплектовании, очистке, хранении, отогления, протравливания и т. п.

1. Где взята средняя проба семян _____
(наименование хлопкозавода,

затотпункта, колхоза, совхоза и др.)

2. Для какой цели отобрана проба _____

3. Лабораторный номер пробы _____

4. Партия семенного хлопка-сырца № _____

5. Семенная партия № _____

6. Порядковый номер пробы по партии _____

7. Происхождение семян _____

(элитное хозяйство и место получения
урожаея текущего года)

8. Способ сбора хлопка-сырца _____

9. Сорт хлопчатника _____

10. Репродукция _____

11. Сортовая чистота _____

12. Группа полей по апробации _____

13. Семена линтерованные, отогленные, калиброванные,
протравленные _____

(нужное подчеркнуть и указать протравитель)

14. Масса партии _____

15. Масса отобранной пробы _____

16. Номер хранилища и способ хранения семян _____

17. Дата отбора пробы _____

Уполномоченный по отбору проб:

(занимаемая должность, подпись)

(Фамилия, и., о.)

Ответственный за хранение

(занимаемая должность, подпись)

(Фамилия, и., о.)

При отборе присутствовали: _____

(занимаемая должность, подпись)

(Фамилия, и., о.)

Ф о р м а 1
Отрывной талон
(вкладывается в банку с семенами
на анализ влажности и
зараженности амбарными
вредителями).

1. Лабораторный номер пробы _____

2. Порядковый № пробы по партии _____

3. Сорт хлопчатника _____

4. Партия семенного хлопка-сырца

№ _____

5. Семенная партия № _____

6. Хранилище № _____

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

Лабораторный номер пробы	Порядковый номер пробы по партии	Номер партии семенного хлопчатобумажного сырья	Номер партии семян	Где взята проба (название организации)	Сорт хлопчатника	Репродукция	Сортовая чистота	Группа полей по апробации	Промышленный сорт хлопчатобумажного сырья	Семена лигериформные, отожженные, калиброванные пропаренные	Номер хранения	Способ хранения	Дата отбора пробы	Дата поступления пробы в лабораторию	Дата начала анализа	Примечания

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

И.А. Родимцев, Е.И. Варсакина, А.И. Котов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 12.05.76 № 1168

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 20290—74	3

4. Постановлением Госстандарта от 07.04.92 № 366 снято ограничение срока действия

5. ИЗДАНИЕ (июнь 2010 г.) с Изменением № 1, утвержденным в марте 1987 г. (ИУС 6—87)