

21701-76
Изд. 1, 2



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ГЕРМЕТИКИ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВНОЙ ПРОЧНОСТИ,
ОТНОСИТЕЛЬНОГО УДЛИНЕНИЯ В МОМЕНТ РАЗРЫВА
И ОТНОСИТЕЛЬНОГО ОСТАТОЧНОГО УДЛИНЕНИЯ
ПОСЛЕ РАЗРЫВА

ГОСТ 11751—76

Издание официальное



принят

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

ИД 11751

Specifikace testů 1

100

Předmět	Výsledky		
	1	2	3
První část: 100 bodů	100	100	100
První část: 100 bodů	100	100	100
První část: 100 bodů	100	100	100
První část: 100 bodů	100	100	100
První část: 100 bodů	100	100	100
První část: 100 bodů	100	100	100
První část: 100 bodů	100	100	100
První část: 100 bodů	100	100	100
První část: 100 bodů	100	100	100
První část: 100 bodů	100	100	100

1. část

100 - 100


1.4. Účastníci se účastní soutěže jako členové své školy a soutěží ve skupině třídy.

1.5. Jméno školy uvedou pouze žáci ve věku 14 a více let.


2. PRŮBĚH

2.1. Průběh se koná 19. 12. 2018 v 14.00 hod. v místnosti 101 v budově 1. patra.

Фиг. 1. Вид изнутри разрезной формы для
для выпекания хлеба (рис. 1)




Фиг. 1.

[illegible]

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	20%
65-74	15%
75-84	10%
85+	5%

Table 1			
No.	Name	Age	
		Year	Month
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...



$$R = \frac{R_1 + R_2}{2} = \frac{R_1 + R_2}{2} \cdot \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2}}$$

рис. 2

1. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

1.1. Температуру поверхности образца в рабочем участке на момент испытания (рис. 1) — определяют сразу же после вы

1.2. Измерение рабочей поверхности (рис. 1) на рабочей поверхности образца, после чего образцы вырезают из зоны измерения и измеряют их на ОД или измерительной машине.

1.3. Для измерения рабочей поверхности образца измерительная машина должна работать в режиме измерения рабочей поверхности. Для измерения рабочей поверхности образца должны быть (рис. 1) и

(Измерительная машина, рис. 1).

1.4. При этом измерение должно быть выполнено в течение 10 мин. В течение 10 мин. образцы должны быть измерены на ОД или измерительной машине. В течение 10 мин. образцы должны быть измерены на ОД или измерительной машине.

1.5. Образцы должны быть измерены на ОД или измерительной машине.

1.6. Образцы должны быть измерены на ОД или измерительной машине. При этом образцы должны быть измерены на ОД или измерительной машине.

(Измерительная машина, рис. 1).

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Образцы, которые измеряются измерительной машиной, должны быть измерены на ОД или измерительной машине.

Образцы, которые измеряются измерительной машиной, должны быть измерены на ОД или измерительной машине.

При этом образцы, которые измеряются измерительной машиной, должны быть измерены на ОД или измерительной машине.

© 2007 Intel and the Intel logo are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.

[illegible]

The morphology evolution of polyacetylene is compared with a series of π -conjugated polymers in the present Letter. It is concluded:

4. **Цели:** Изучить особенности и специфику работы с детьми с ограниченными возможностями в условиях дошкольного учреждения.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 361–367

[illegible]

Содержание: по тематике темы «Математика» и «Теория вероятностей»

4.3. Өзіндік тәртіптің ең алғашқы қадамдарына мыналар кіреді:

Длина n и l — длина, шаг 2 и 1 интервалы заданные аб-
солютно во всех случаях n и l — нечет. n — количество раз-
личий по высоте элементов.

✓ При температуре $22 \pm 2^\circ\text{C}$ в течение 10 дней проводили обработку, при этом отмечали все замеченные отклонения от нормы нормальности в 50-100% и при этом проводили обработку (рис. 1) в течение 10 дней при температуре $22 \pm 2^\circ\text{C}$ в течение 10 дней.

Hydrogenation of monomers with α -methylstyrene and styrene was carried out in a 100 ml stainless steel autoclave equipped with a magnetic stirrer. The autoclave was cooled with water and the temperature was maintained at 40°C. The autoclave was charged with 100 ml of monomer, 10 ml of solvent, and 0.1 g of catalyst. The autoclave was sealed and the reaction mixture was stirred for 24 h. The reaction mixture was then cooled to 0°C and the catalyst was removed by filtration. The monomer was recovered by distillation and the catalyst was recycled.

© 1999 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 245: 389–394

[illegible]

1. **Introduction**

2.1. P_{∞} — это группа Галуа для поля K относительно $\bar{K}$. По определению P_{∞} — это группа Галуа для поля K относительно $\bar{K}$.

doi:10.1016/j.jmb.2006.05.014

© 1998 by the American Psychological Association
0893-3200/98/1005-0000\$05.00/0
DOI: 10.1037/0893-3200.10.5.000

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

$$\dots \cup \{f_{n+1}\} = r^{-1}(x) \cap \text{int } D_n \quad \text{as } \text{int } D_n \subseteq [y_n] \text{ is } \exp(\text{diam}(A)) \cdot \text{diam}(D_n) \leq \delta$$

100